



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	725
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	8061
Marka veya Ticari Adı(varsa)	BİOVİN PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	46
Organik Karbon %	18
Organik Azot %	2
Suda Çözünür K ₂ O %	7
Serbest Aminoasit %	4
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1-6-13-25-27-40 Kg 1-5-10-20-30 Lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 30/09/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik”

Tarih: 30/09/2020

Dr. Ersin DİLBER
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Organik Ürün
Bitkisel Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre
BIOVİN PLUS

1159

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:	Kütlece (w/w)%
- Toplam Organik madde	: 46
- Organik Karbon	: 18
- Organik Azot	: 2
- Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	: 7
- pH	: 4 – 6
- Serbest Amino Asit	: 4
- Hammadde	: Bitkisel Kökenli

Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlığı : 1, 6, 13, 25, 27, 40 kg.. // 1, 5, 10, 20, 30 lt..

Firma Unvanı Adresi ve Telefonu:

Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. Çumra Şeker Entegre Tesisleri
Tel : 0 332 221 73 00 Fax: 0 332 221 73 94
cumraseker@konyaseker.com.tr www.konyaseker.com.tr

Risk ve Güvenlik İşaretleri:



Lisans Numarası : 725
Tescil Numarası :

DİĞER TEKNİK BİLGİLER:

Su ile karıştırıldıktan sonra dört saatten fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.
Biovin Plus aşırı alkali ilaç ve gübrelerle karıştırılmaksızın kullanılmalıdır.
Biovin Plus uzun süre hareketsiz bekletildiğinde çökelme yapabilir. Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız.

BIOVİN PLUS'IN UYGULAMA KOŞULLARI:

Su ile her oranda karıştırılabilir ve toprağa verilir. Biovin bazı bakırlı ve kireçli bileşikler dışında her türlü gübre ve ilaçla karıştırılarak kullanılabilir.
Biovin Plus kumlu ve hafif topraklara, ekim ve dikiminden sonra sulama suları ile uygulaması daha iyi sonuç verir.
Biovin Plus'ın açık alanlardaki yetiştiricilikte (meyve, sebze, tarla, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve orman ağaçları) bir sezonda kullanılacak miktarı 10-20 kg/dekardır.
Biovin Plus'ın ekim dikiminden önce tabana verilebileceği gibi her türlü sulama sistemiyle (yağmurlama, damlama sulama) her sulamada gerekli miktar kadar sisteme verilerek kullanılır.
Biovin Plus damlama sulama ile kullanılacaksa her sulamada gerekli miktar sisteme enjekte edilerek verilir. Memelerde kesinlikle tıkanma oluşturmaz.
Biovin Plus'ın uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bayinize başvurunuz.

RİSK VE GÜVENLİK AŞAMALARI

Cilt ve göz teması halinde hemen bol su ile yıkayınız.
Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Güneş ışığına doğrudan maruz bırakmayınız.
Depolama sıcaklığı -10°C / +50°C

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürünün Doğru ve Verimli Kullanımı:

Ürün	Biovin Plus Dozları	Uygulama Zamanı ve Şekli
Yaprakları yenen sebzeler	300-500 cc/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder.
Domates, Patıcan, Biber, Kabak, Hıyar, Kavun, Karpuz	400-800 cc./dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder.
Meyve ağaçları	600-1000 cc./dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre 10-15 günde uygulama yapılabilir. Ağaç başına 300-500 gr uygulanır.
Tahıllar	400-800 cc/dekar	Her sulama ile verilebilir.
Endüstri bitkileri (şeker pancarı, tütün, turp, pamuk, ayçiçeği, patates, soğan, havuç, kanola, yer fıstığı, susam)	300-600 cc/dekar	Her sulama ile verilebilir.
Çilek	300-500 cc/dekar	Yeşil aksam oluşuktan sonra 10-15 gün aralıklarla sulama suyu ile topraktan verilmelidir.
Bağ	200-400 cc/dekar	Yetiştirme dönemi boyunca verilebilir, koruk döneminde dozaj artırılarak devam edilir.

30.09.2020

PIYASAYA SUNACAĞIMIZ ÜRÜN ETİKETİ İLE AYNI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER, AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK CEZAI İŞLEMİ KABUL EDERİZ.

Fuat AKAY
Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş.

F. Akay
Fuat AKAY
Çumra Şeker Kampüs Direktörü