



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	725
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	8062
Marka veya Ticari Adı (varsa)	BİOVİN
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	45
Organik Karbon %	19,5
Toplam N %	3
Suda Çözünür K ₂ O %	7
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 lt 1 - 6 - 13 - 25 - 27 - 40 kg
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	SÜRE DOLUMUNDAN YENİLEME
Bu belge 23/08/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:23/08/2021

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Organik Gübre
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
BLOVIN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:	Kütlece (w/w)%
- Toplam Organik madde	: 48,0
- Organik Karbon	: 19,5
- Toplam azot	: 3,0
- Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	: 7,0
- pH	: 4 - 6
- Hammadde	: Bitkisel Kökenli Sıvı Hammadde

1027

Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlık ve hacimleri : 1, 5, 13, 25, 27, 40 kg
: 1, 5, 10, 20, 25, 30 Litre

Firma Unvanı Adresi ve Telefonu:
Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. Çumra Şeker Entegre Tesisleri
Tel : 0 332 221 73 00 Faks: 0 332 221 73 94
cumraseker@konyaseker.com.tr www.konyaseker.com.tr

Risk ve Güvenlik İşaretleri



Lisans Numarası : 728
Tescil Numarası : 8882

DİĞER TEKNİK BİLGİLER:

Toprak ve/veya yaprak eneksi yapılarak kullanılması tavsiye edilir.
Su ile karıştırıldıktan sonra dört saatlik beklemeden kullanılmalıdır.
Blovin sıvı ekali ila ve gübrelerle karıştırılmaksızın kullanılmalıdır.
Blovin uzun süre hareketsiz bekleştirildiğinde koloidler çökebilir. Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız.

BLOVIN'IN UYGULAMA KOŞULLARI:

Su ile her oranda karıştırılabilir ve toprağa verilir. Blovin bazı bakırı ve idreçli bileşimler dışında her türlü gübre ve ila ile karıştırılarak kullanılabilir.
Blovin kumlu ve hafif topraklara, ekim ve dikimden sonra sulama suyuyla uygulaması daha iyi sonuç verir.
Blovin'in açık alanlardaki yetiştiriltilikte (meyve, sebze, tarla, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve orman ağaçları) bir sezonda kullanılacak miktar 90-120 kg/dekardır.
Blovin'in ekim dikiminden önce tabana verilebileceği gibi her türlü sulama sistemiyle (yağmurlama, damlama sulama) her sulama için gerekli miktarlar sisteme enjekte edilir.
Blovin damlama sulama ile kullanılacaksa her sulamada gerekli miktar sisteme enjekte edilerek verilir. Memelerde kesinlikle tıkanma oluşturmaz.
Blovin'in uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bayinize başvurunuz.

RİSK VE GÜVENLİK AŞAMALARI

Cilt ve göz teması halinde hemen bol su ile yıkayınız.
Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Gıdelerden uzak tutunuz.
Güneş ışığına doğrudan maruz bırakmayınız.
Depolama sıcaklığı: -10°C / +50°C
Parti No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürünün Doğru ve Verimli Kullanması:

Ürün	Blovin Dozları	Uygulama Zamanı ve Şekli
Yaprakları yenen sebzeler	1000-2000 cc/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder. 3-4 uygulama yapılabilir.
Domates, Patlıcan, Biber, Kabak, Hiyer, Kavun, Karpuz	2000-3000 cc/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder. 4-5 uygulama yapılabilir.
Meyve ağaçları	4000-6000 cc/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre 10-15 günde uygulama yapılabilir. Ağaç başına 300-500 gr uygulanır.
Tahıllar	2000-3000 cc/dekar	Her sulama ile verilebilir. 4-5 uygulama yapılabilir. Her uygulamadan sonra 15-20 dakika temiz su verilmelidir.
Şeker pancarı, patates, mısır, ayçiçeği, turp, soğan, havuç, karnak, yer fası, susam, tütün, pamuk	1000-2000 cc/dekar	Her sulama ile verilebilir. 4-5 uygulama yapılabilir. Her uygulamadan sonra 15-20 dakika temiz su verilmelidir.
Çiçek	1000-2000 cc/dekar	Yeşil elemanı oluştuktan sonra 10-15 gün ara ile sulama suyu ile topraktan verilmelidir.
İlaç	2000 cc/dekar Hammade	Yetiştirme dönemi boyunca verilebilir, kurak dönemde dozaj artırılarak devam edilir.

FIYASLARA BUNACAĞIMIZ ÜRÜN ETİKETİ İLE AYNI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER, AKŞİNİN TESPİTİ HALİNDE 4763 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK CEZAYİ İŞLEMİ KABUL EDERİZ.

Mehmet ÇAKICI
Biyoteknoloji Üretim Müdürü

Fuat AKAY
Çumra Şeker Kampüsü Direktörü